

DIAGNOSES DE CLÉRIDES INDOCHINOIS NOUVEAUX
APPARTENANT AU GENRE CLADISCUS,

PAR M. PIERRE LESNE.

Cladiscus laotianus n. sp.

Long. 9-13 mm.

Corpus angustum, elongatissimum, undique setis longioribus nigris hirsutum, capite, prothorace elytrisque rufis, pectore brunneo vel rubescente, abdomine nigro vel brunneo, antennis pedibus oculisque nigris, palpis brunneis.

Caput supra dense subtenuiter, pronotum fortius punctata. Prothorax antèrius modice dilatatus, postice fortiter constrictus, ad marginem basalem haud bituberculatus, sulculo transversali antico vix manifesto, pleuris juxta coxas (desuper inspectis) gibbosis. Elytra punctis grossis subquadratis densis regulariter seriatim digestis insculpta, apice sublævia. Abdominis sternitum primum linea mediana cariniformi.

♂. *Oculis maximis, lobis duobus subæqualibus; fronte (inter oculos) dimidiam partem clypei fere attingente; antennis pectinatis, articulis 3-10 intus processu cuneiformi apice oblique truncato singulis productis, articulo ultimo fusiformi; abdomine nitido, setis rigidis longioribus suberectis vestito, segmento 5° transverso, rectangulo, margine apicali medio leviter subample emarginato.*

♀. *Oculis minoribus; fronte (inter oculos) latitudinem totam clypei fere æquante; antennis serratis, articulo 3° elongato, 4°-10° triangularibus, ultimo ovato; abdomine subsurdo, plus minusve rugoso-punctato, setis molli-bus brevioribus partim vestito, segmento 5° apice fortiter emarginatum, incisuræ angulis acutis, reflexis, prominulis, segmento 6° deplanato, præcedentis dimidiam partem (secundum lineam medianam mensurato) superante.*

Laos : Vien-Tiane, à la fin de mai et au début de juin (Vitalis de Salvaza in Muséum de Paris); Pach. . . (Mouhot in Muséum de Paris).

Appartient, comme l'espèce suivante, au groupe du *Clad. longipennis* Westw.

Cladiscus dimorphus n. sp.

Long. 13-14 mm.

Corpus angustum, elongatissimum, undique setis nigris haud densis hirsutum, capite prothorace elytrisque rufis, pectore abdomineque brunneis plus minusve rufescentibus hoc lateraliter rufo maculato; oculis appendicibusque nigris.

Caput subdense, pronotum sparsim tenuiter punctata, hoc basi ruguloso haud bicalloso. Prothoracis pleuræ (desuper inspectæ) juxta coxas gibbosæ. Elytra punctis grossis subquadratis densis regulariter seriatim digestis insculpta, apice sublævia. Abdominis sternitum primum (basi excepta) ecarinatum.

♂. Gracilius, capite (oculis inclusis) latitudinem anticam prothoracis multo superante, oculis maximis, antice profunde angulatim incisis, lobo inferiore maximo, convexissimo; fronte (inter oculos) tertiam partem clypei haud superante; antennis ramosis, articulis 3°–11° elongatis, cylindricis, processibus duobus longis filiformibus tortilibusque, in basem extremam articuli insertis, setulisque erectis hirsutis, singulis instructis; abdomine subhirsuto, segmento 5° apice leviter late sinuato, 6° brevissime manifesto.

♀. Capite (oculis inclusis) latitudinem anticam prothoracis paullo superante, oculis mediocribus, lobis duobus subæqualibus; fronte ampla, tumida, convexissima, latitudine interoculari latitudinem clypei fere æquali; antennis brevibus, crassis, setis densis nigris hirsutis, articulo 3° elongato, 4°–10° intus processu plus minusve bifido, lobo antico brevissimo, postico elongato, digitiformi, articulo ultimo subovato intus dentato; prothorace antice quam in ♂ multo magis dilatato; abdomine dense tenuiter punctato, segmento 5° apice profunde lateque arcuatim emarginato, incisuræ angulis obtusis, 6° (secundum lineam medianam mensurato) præcedenti longitudine subæquali, margine postico arcuato, breviter nigro fimbriato.

Laos : Vien-Tiane, à la fin de mai et au début de juin (Vitalis de Salvaza in Muséum de Paris).

Cladiscus clavatus n. sp. (♂).

Long. 14 mm.

Corpus angustum, elongatum, undique setis brunneis hirsutum, capite prothorace elytris palpisque rufis, pectore, abdomine, antennis pedibusque nigris.

Caput supra dense tenuiter punctatum, oculis mediocribus lobis duobus subæqualibus, temporibus callosis. Prothorax antice latitudinem totam capitis subæquante, postice fortiter constrictum, lateraliter juxta coxas haud gibbosum, sulcis transversalibus (antico et postico) manifestis, tenuiter subsparsim punctatum, basi bicallosum. Elytra punctis grossis densis regulariter seriatim digestis insculpta, apice sublævia.

♂. Antennis articulis 3°–10° processibus duobus æqualibus digitiformibus breviter pubescentibus singulis instructis, articulo 11° compresso, securiformi; abdominis segmento 1° ecarinato, 5° rectangulo margine postico rectissimo haud emarginato, 6° brevissimo, transverso.

Laos : Vien Tiane, en juin (Vitalis de Salvaza, Muséum de Paris);
Cochinchine : Cap-Saint-Jacques (Coll. E. Cordier).